

國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院

民眾用藥諮詢Q&A

藥物諮詢專線	藥物諮詢信箱
斗六院區：05-5323911 分機5186、5189 虎尾院區：05-6330002 分機8101、8151	斗六院區： drug_dl@ms1.ylh.gov.tw 虎尾院區： drug_hw@ms1.ylh.gov.tw

編號	諮詢問題	答覆	參考文獻
1	請問 B B Lotion(利蝨洗液)治療疥癬，怎麼用？	<ol style="list-style-type: none"> 1.使用前需搖勻。 2.疥癬或疥瘡：先將身體洗淨擦乾後，將此藥液搖勻，取藥液自頸部往下塗抹全身，藥液需留置體表24小時後再洗掉。--用水洗淨患處擦乾，再數上此藥，每日數次。 3.感染較嚴重的病人，可遵循醫師的指示，於第一次使用後24小時至5天內，再次依上述步驟使用本品一次。 	台大藥劑部網頁
2	病患詢問Actein發泡錠如何服用？	請將發泡錠放在玻璃杯內用少許水溶解後再服用。	仿單
3	服用Adalat OROS 發現糞便中有藥的空殼排出，是正常現象嗎？	此藥為持續性釋放劑型，藥品被包覆在不消化的空殼中持續釋放出來，空殼會隨糞便排出。	仿單
4	請問Aldara如何使用？	<p>使用方法</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 臨睡前，請將雙手洗淨，然後拆開包裝袋，將「樂得美」乳膏擠於手指頭上 2. 將乳膏薄塗於潔淨而乾爽的疣患表面，輕輕按摩，直至乳膏完全滲透。 3. 完成後，請把剩餘的乳膏連包裝袋一併丟棄，勿讓兒童接觸。請以性質溫和的肥皂和水清洗雙手。 4. 在塗抹乳膏後六至十小時內，請勿洗澡。 5. 六至十小時後，應以性質溫和的肥皂和清水潔淨患處。 	仿單
5	請問使用Aldara會很癢，請問是正常的嗎?要怎麼用會比較好？	使用Aldara後會產生癢的反應可能與個人的體質有關，可與醫師反應後由醫師協助開立藥品緩解症狀，切勿自行服用或於患處塗抹其他藥品，尤其是類固醇藥品，會嚴重影響Aldara的療效。	Micromedex/ 仿單
6	長期服用aspirin預防中風是正確的用法嗎？	低劑量的aspirin具有抑制血小板凝集的功能，可以防止血栓的形成，因此可以長期服用來預防中風。	用藥安全手冊 600問
7	我長期在服用ASPIRIN 預計要做牙齒,醫生要我停藥，可是我又擔心停藥後會引發心肌梗塞那藥怎辦？	在長期服用ASPIRIN要行牙科或手術需要停藥一週以免影響凝血功能，建議回診詢問主治醫師現階段病情是不適合停藥進行牙科手術，以確保病情的穩定。	台大藥劑部 網頁
9	請問Ativan 作用時間？	Duration：6-8 小時。	UpToDate
10	請問 安滅菌糖漿用粉劑 (Augmentin susp) 如何泡製？	<ol style="list-style-type: none"> 1.配製懸浮液前請先將藥瓶內之乾粉或顆粒搖鬆。 2.藥瓶內加入適量冷開水(加水道瓶身箭頭標示處的三分之二處)，蓋上瓶蓋，搖動瓶身充分搖勻。接著加入更多水，直到液面到達瓶身箭頭標示處。 3.或直接加入32毫升的冷開水搖勻。 4.加水配製後之藥品請置於冰箱冷藏。 5.每次服藥前請先徹底搖勻本懸浮液再使用。 	仿單
11	小朋友服用Augmentin大便會比較稀？	該藥品常見副作用是胃腸不適,是有腹瀉的副作用,若有持續嚴重腹瀉的情況發生,請立即回診就醫。	台大藥劑部網頁
12	病患詢問Avamys Nasal Spray只需要對過敏的那個鼻孔使用嗎？	為達最佳治療效果，需要兩邊鼻孔都要使用。	仿單

國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院

民眾用藥諮詢Q&A

藥物諮詢專線	藥物諮詢信箱
斗六院區：05-5323911 分機5186、5189 虎尾院區：05-6330002 分機8101、8151	斗六院區：drug_dl@ms1.ylh.gov.tw 虎尾院區：drug_hw@ms1.ylh.gov.tw

編號	諮詢問題	答覆	參考文獻
13	Babyate 保兒力維持液要如何使用？	為電解質水，讓小朋友當開水喝，開封後24小時若未喝完即須丟棄。未開封則可存放至瓶上的保存期限。開瓶方式：取其藍色瓶蓋反面，有內凹橫線，對準瓶口轉開即可。	仿單
14	病人泌尿道感染，服用Baktar1粒後，隔天早上起床後雙眼水腫，詢問該如何處置？	請停藥立即就醫。	台大藥劑部網頁
15	Baraclude貝樂克膜衣錠要飯前還是飯後服用？	應空腹服用(飯前或飯後間隔至少2小時)	仿單
16	我有胃潰瘍的病史，Bokey、Plavix,都有抗凝血的作用，哪一個藥比較適合？	文獻顯示對胃部的傷害Bokey比Plavix 發生機率高(Aspirin：2.7%、Plavix：2%)。Plavix 是較好的選擇。	Micromedex
17	請問Celebrex是否可與酒精併服，會有什麼副作用？	1、服用藥物本身就不建議與非開水類一起服用，輕則影響藥品藥效，重則產生不良反應。 2、Celebrex若與酒精併服，會加強胃腸刺激的副作用。	Micromedex
18	請問服用Colchicine會拉肚子嗎？	副作用噁心、嘔吐、腹瀉、血便或血尿；蕁麻疹；皮膚紅點；發燒、頭痛；肌肉無力、手指或腳趾麻木感，掉髮等。若有出現腹瀉情況請停藥，並回診告知醫師。	台大藥劑部網頁
19	Concerta ER 18 mg/tab專思達長效錠會整粒排出嗎？	CONCERTA 須以液體輔助整顆吞服,不能咀嚼、剝開或壓碎。藥物被包在不被吸收的殼內,其設計是要持續釋出藥物。錠劑的殼連同不可溶的核心成份排出體外,假如患者偶而注意到其糞便內含狀似錠劑之東西毋須擔心。	仿單
20	醫生開康肯我不小心多吃一顆會不會怎麼樣？	詢問患者目前狀況無礙。回覆患者Concor 5 最大劑量可到 20mg，服用劑量雖未超出最大劑量，但若產生身體不適等症狀請立即回醫就診。 常見的副作用心跳變慢、四肢冷感、眩暈、疲倦、頭痛、睡眠障礙等	台大藥劑部網頁
21	請問 Coumadin可否和Celebrex併用？分開服用可以嗎？	Coumadin和Celebrex併用會增加出血的風險,但這不是分開服用就可以避免的,建議加強觀察病人有無不正常瘀青,牙齦出血等症狀，若有則需立即回診,建議病人於下月回診,請醫師監測一次凝血數值。	Micromedex
22	先前服用過Licodin，後來醫師改開立Coumadin，兩種藥物作用有不一樣嗎？何者的藥效較強？	Licodin- 增強血小板的Adenylate cyclase的活性，提高血小板內cAMP的產生，抑制血小板凝集、釋出。 Coumadin- 藉由抑制會導致血栓物質之形成而延遲血液之凝固，可用來預防血栓之形成或增大，常用於心臟病發作後或心臟瓣膜置換手術後。 這兩種藥物雖同為抗凝血藥但其作用方式不同，不適用來比較藥效。	台大藥劑部網頁
23	我要準備拔牙有在服用coumadin要停一個星期，那拔完牙之後多久才可以服用抗凝血藥品？	手術後若以完全止血,可於術後12~24小時開始服用coumadin,要停藥拔牙前請先詢問主治醫師是否是何停藥	台大藥劑部網站

國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院
民眾用藥諮詢Q&A

藥物諮詢專線	藥物諮詢信箱
斗六院區：05-5323911 分機5186、5189 虎尾院區：05-6330002 分機8101、8151	斗六院區：drug_dl@ms1.ylh.gov.tw 虎尾院區：drug_hw@ms1.ylh.gov.tw

編號	諮詢問題	答覆	參考文獻
24	Cravit藥袋上說明要服用大量的水，請問要喝多少呢？同時有在使用 Prometin，此種藥是否可以和 Cravit一起使用？	由於Cravit(levofloxacin)會經由腎臟排除，為了加速藥品排除，所以服用Cravit(levofloxacin)時(飯前、飯後皆可)必須同時喝大量的水，建議為8ounce，大約為250cc。另 Prometin(metoclopramide)可與Cravit(levofloxacin)一起服用，但注意Prometin(metoclopramide)需飯前服用。	台大藥劑部網頁
25	Depakine Solution 200 mg valproate sodium/mL, 40 mL/btl 帝拔癲口服液吸管如何使用？	Depakine Solution 所附吸管左側是顯示,ml數右側是顯示mg數.p't使用1 mL HS,睡前將吸管插入藥液中拉至左側1ml處,即是正確給藥量.可以少量非發泡性飲料稀釋後服用.	仿單
26	吃岱蜜克龍 Diamicon MR 30 mg/tab會傷肝嗎？	目前文獻資料顯示服用岱蜜克龍曾有發生肝炎的個案，但副作用並非都會發生，可以與醫生討論過去病史及目前狀況來評估使用效益後，按時服藥來控制血糖問題並留意是否有副作用發生的徵兆如噁心、嘔吐、尿變黃暗、疲倦、全身無力、皮膚、眼睛變黃、及黃疸的情況持續發生，便盡快回診觀察。	Micromedex/ 仿單
27	月經3個月沒來，醫生開避孕藥 Diane給我，服用2天就來了，還要繼續服用嗎？	您接受是賀爾蒙人工週期療法，可調整賀爾蒙分泌穩定週期性變化。此治療在初期可能出現不規則的出血(點狀出血或突然出血)，仍需依指示服藥並定期回診，直到醫師評估才可依指示停藥。若在經過約3個週期的適應期後仍有不規則的出血或不明原因嚴重出血請立即回診追蹤。	仿單
28	病患詢問使用Differin Gel需要防曬嗎？	藥物使用後，對日光會有敏感現象，故應盡量避免曝露於日光與太陽燈之下，若有需要應做好防曬準備。	仿單
29	請問 Dilatrend是治療什麼？	衛生署許可證:鬱血性心臟衰竭。藥品作用:治療高血壓、心衰竭等	仿單
30	停經婦女使用的Divina，目前本院還有其他替代藥嗎？	院內並無相同品項，同類藥品有： 1.Sevina Tablet 12 blue tablets, 10 white tablets & 6 orange tablets/pack衛生署適應症雌性激素不足所引起之諸症狀和預防更年期婦女骨質流失。藍色錠含 estradiol 2 mg共12粒，白色錠含 estradiol 2 mg and norethindrone acetate 1 mg共10粒，橘色錠含 estradiol 1 mg共6粒。 2.Covina Tablet 28 tablets/pack衛生署適應症雌性激素缺乏症、包括避免骨質流失。每錠含 Estradiol 2mg and Norethisterone Acetate 1mg。	台大藥劑部網頁
31	Dolcol可以跟plavix一起吃嗎？有在吃nacid可以依起吃嗎？	1.Dolcol罕見的副作用會造成血小板減少。建議患者同時在服用抗凝血藥品，如有皮下出血或刷牙有流血情形，請立即回診就醫。 2.應該避免跟含鎂、鋁同時使用，建議nacid與dolcol間隔兩小時在服用。	Micromedex/ 仿單

國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院

民眾用藥諮詢Q&A

藥物諮詢專線	藥物諮詢信箱
斗六院區：05-5323911 分機5186、5189 虎尾院區：05-6330002 分機8101、8151	斗六院區： drug_dl@ms1.ylh.gov.tw 虎尾院區： drug_hw@ms1.ylh.gov.tw

編號	諮詢問題	答覆	參考文獻
32	Doxaben XL4 mg/tab可迅持續性藥錠會整粒排出嗎？	Doxaben XL 應整錠吞服，不可以嚼碎、分割或磨碎藥錠。如果患者偶然注意到糞便中有個像藥錠的東西，患者不必擔心。Doxaben XL的藥物是被包在一個不能吸收的外殼內，這種特殊設計可以緩慢釋放藥物，讓身體能吸收它。當這個過程完成後，空藥錠就從身體排出。	仿單
33	今天醫師多開立了可迅這個藥品吃了之後心跳變快還可以再吃嗎？	因為您為第一次服用所以可能會感到想睡、暈眩、頭痛、虛弱、心悸等這些副作用。在治療幾星期後會逐漸消失，如果這些症狀一直持續且很嚴重，就必須回診告知醫師了，若身體仍有任何不適請記得打電話過來詢問。	台大藥劑部網站
34	醫師有開MgO及Dulcolax來幫助便秘，請問作用為何？	MgO為軟便劑，主要是保持糞便內的水份，增加腸道蠕動。長期使用會造成電解質不平衡；若腎功能不佳者，可能會導致鎂離子過高。 Dulcolax為刺激性瀉劑，主要是刺激腸道的神經叢或刺激腸內水分及電解質的分泌，增加腸道的蠕動能力。長期使用會造成習慣性便秘，不服藥就無法解便，引起結腸失去張力；原則上，刺激性瀉劑不要連續使用超過一星期。	用藥安全手冊
35	Duofilm要如何使用？	1.使用前先將疣（雞眼）之部位浸泡於熱水至少五分鐘，然後用乾毛巾擦乾。 2.疣（雞眼）之表面用浮石或銼刀輕輕磨去多餘角質。 3.每天1~2次，使用所附的刷子，將2~4滴的「治疣液」均勻塗刷於疣（雞眼）之患部，塗抹第1遍之後，請戴患處完全乾後，再塗抹第2遍。 4.擦過藥之後，可用透氣膠帶輕敷於疣（雞眼）的表面。	
36	請問EPO離開冷藏之後多久還可使用？從早上10點多至下午2點放在車上，還可以用嗎？	根據Recormon(Epotein beta)的仿單建議，可每單一時間內在室溫存放最多三天的時間(最高攝氏25度)。夏天又正中午車上的溫度較高，溫度可能高達40°C，不建議再使用。	仿單
37	病患詢問為何Ergoton Film Coated Tablet不建議長期服用？	因為長期投與會引起血管過度收縮及動脈內膜炎，應小心觀察，慎重投與，又長期投與後立即停藥時偶有頭痛禁斷症狀發生。	Micromedex
38	請問Fentanyl 貼片如何使用？	1.一片貼片可以使用3天 2.可貼於上半身光滑皮膚上（請避開毛髮及傷口） 3.更換貼片時，不要再貼於相同部位 4.若貼片脫落，請更換新的貼片 5.請將廢片收集後，回診時交付給藥局	仿單
39	醫師開Ferrum Hausmann Chewable一個月給我，如果已經沒有貧血了還繼續吃，會有什麼副作用嗎？	經查詢仿單建議為大量補充體內鐵質庫存在血質(Hb、Ht、紅血球)正常後最好再續用一個月。可能引起的副作用為胃痛、便秘、腹瀉、抽筋、噁心、嘔吐、黑便、深色尿液、心灼熱感等，醫師也會根據抽血的檢查來評估是否仍需用藥。	仿單
40	治療便秘Fleet Phospho-Soda Oral Saline Laxative 45 mL/bt 佛利特護舒達口服液該如何服用？	便秘治療可於早飯前30分或空腹服用，請依醫師指示用量服用(一天服用不可超過45ml)，加入240ml冷飲或水中喝下，並盡可能多喝水(最少240ml)以補充瀉下所流失的水分。一般在服用後30分鐘至6小時會產生排便(視服用劑量不定)，也可放入冰箱冷藏增加口感但不可冷凍。	仿單

國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院

民眾用藥諮詢Q&A

藥物諮詢專線	藥物諮詢信箱
斗六院區：05-5323911 分機5186、5189 虎尾院區：05-6330002 分機8101、8151	斗六院區：drug_dl@ms1.ylh.gov.tw 虎尾院區：drug_hw@ms1.ylh.gov.tw

編號	諮詢問題	答覆	參考文獻
41	請問Fleet灌腸液要如何使用？	<p>一、檢查前飲食注意事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 檢查前二天宜進食低渣飲食(如稀飯)，不宜吃高纖維、高蛋白食物。忌服牛奶。 檢查前一天請進食清流質飲食如:濾渣果汁、運動飲料。 <p>二、用量及方法：</p> <ol style="list-style-type: none"> 檢查前一天的晚餐時間(19:00)喝一瓶Fleet(清腸液)，檢查當日早上(7:00)再喝一瓶Fleet(清腸液)。 服用方法:將一瓶Fleet(清腸液) 加入240-360 CC冷飲中稀釋喝下(可分成2次慢慢喝)。之後喝約1500-2000 CC水(可分次慢慢喝完)。 <p>三、注意事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 為讓清腸效果更佳，喝完清腸液到檢查前這段期間應儘量多喝水或運動飲料(至少1500 CC)。 稀釋用的冷飲，建議用甜的無渣飲料(如:沙士、可樂、冬瓜茶)以增加口感，方便服用。 服用後約30-60分鐘開始想排便，藥物作用時間約4小時。(每人情況不一定)。 腎衰竭、鬱血性心衰竭、肝硬化合併腹水、先天性巨結腸症等之疾病的病患請勿使用。 	仿單
42	請問Florinef 有升壓的作用嗎？	Florinef 有升壓的作用。	Micromedex
43	請問長期服用利尿劑(Fluitran) · 會造成尿酸過高嗎？	高尿酸血症的發生可能與 Fluitran 相關，請進一步和醫師聯絡。	Micromedex
44	為什麼服用Fosamax 後至少半小時不要躺平？	可減少心臟灼熱或對食道的傷害，而且站立或坐直可以增加本藥的吸收。	仿單
45	Fosamax福善美保骨錠的使用方式？	每週一次，早上空腹服用，空腹服用以200~300C.C.開水伴服。 注意事項：服用後半小時後才能進食或服用其他藥物，亦應服藥半小時內不要平躺，應直立上半身以增加藥品吸收。應整粒吞服、不咬碎、撥半、咀嚼。	仿單
46	去看牙醫時醫師表示因為我有服用Fosamax，因此目前不適於拔牙，請問是真的嗎？Fosamax跟拔牙真的有關係嗎？	<p>Fosamax是藉由影響正常骨頭新陳代謝的過程以避免骨質流失的藥品。拔牙的傷口癒合需要一些特殊細胞(蝕骨細胞)的存在，如果沒有這些細胞就不會有新骨頭生成作用的發生，在骨頭受傷或感染下，骨頭無法修復，產生壞死的機會也就增加。</p> <p>根據建議，長期服用雙磷酸鹽類藥物的患者，在接受拔牙植牙等侵入性的牙科治療前3個月至治療後3個月，應儘可能停止口服雙磷酸鹽類藥物，以降低顎骨壞死的發生率。</p>	Micromedex/ 仿單
47	請問Geodon副作用	可能會引起頭痛、嗜睡、頭暈、虛弱、腸胃不適、不自主運動、體重增加、心律不整等	台大藥劑部網頁
48	Harnalidge藥袋上的副作用有射精液？	發生率：8.4% to 18.1%	Micromedex

國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院

民眾用藥諮詢Q&A

藥物諮詢專線	藥物諮詢信箱
斗六院區：05-5323911 分機5186、5189 虎尾院區：05-6330002 分機8101、8151	斗六院區：drug_dl@ms1.ylh.gov.tw 虎尾院區：drug_hw@ms1.ylh.gov.tw

編號	諮詢問題	答覆	參考文獻
49	請問我服用合必爽後，四肢水腫，請問是否為這個藥品的副作用？	合必爽Herbesser (diltiazem HCl)在下肢水腫的副作用，發生機率約為4.6%-8%，症狀持續且嚴重時請進一步和醫師聯絡	Micromedex
50	請問Lasix和Aldactone有何不同？	Lasix和Aldactone兩者對體內的電解質濃度影響不同，醫師會就患者情況選用、或併用。	Micromedex
51	患者因下肢水腫而困擾，詢問所吃的藥品中是否有消水腫？	患者的用藥紀錄，每日服用利尿劑Lasix 1/2#，可治療水腫。	Micromedex
52	病患詢問使用中的Levemir® FlexPen®還需要冷藏保存嗎？	使用中的Levemir®FlexPen®不應置於冰箱內。使用中或隨身攜帶備用的Levemir®FlexPen®應置於常溫(不超過30°C)最長可達6週。	仿單
53	Lexapro 是興奮劑嗎？服用後有點睡不著怎麼辦？	Lexapro 不是興奮劑，失眠的發生率：7-14%，若症狀持續或嚴重時，請告知醫師。	Micromedex
54	服用Lipitor 20mg 兩、三天後，手及腳長出紅疹(2、3顆)，是藥物引起的嗎？可換藥？	現有文獻記載Lipitor發生皮膚副作用症狀包含搔癢、接觸性皮炎、皮膚乾燥、出疹、座瘡、濕疹、皮脂漏、皮膚潰瘍等。發生機率小於2%。若症狀嚴重或未改善，應回診告知醫師。	Micromedex
55	Madopar125mg 會造成眼睛模糊的副作用？	文獻上顯示Madopar125mg 會造成眼睛模糊的副作用，衛教患者應回診與醫師討論用藥，切勿自行停藥。	Micromedex
56	請問Mycostatin suspension 是否可吞服？	可以，但本藥品口服後幾乎不吸收，然而最後需吞下或吐出懸液需由醫師依照您的狀況進行評估。	台大藥劑部網頁
57	請問Neupro Transdermal Patch 的使用方式？	<ol style="list-style-type: none"> 通常為每日一次，貼在潔淨、乾燥、沒有損傷、無毛髮的皮膚表面，如腹部、大腿、臀部、側腰部、肩部或上臂，同一部位應至少間隔14天。 使用前請用肥皂清潔手部，自包裝袋內取出貼片，先撕開透明保護膜一半後，黏貼於皮膚上，再撕掉另一半，此時，不要碰觸貼片黏性部份，用手掌將貼片按下，壓20-30秒，確認黏貼牢固，尤其是貼片周圍，之後再用肥皂清潔手部。 固定時間更換貼片，移除貼片後，再貼上新的一片於皮膚的不同區域。使用後之貼片請將黏貼面對折後，放入原包裝袋內丟棄，並避免孩童及寵物接觸。 一張貼片勿使用超過24小時，超過時間不會達到藥效，且可能會刺激皮膚。 	仿單
58	請問Q10的商品名是什麼？是否為輔酶？作用為何？	本院Q10商品名為Neuquinon，作用為輔酶，大多作為抗氧化及穩定細胞膜之作用，常用於輔助治療心衰竭。	仿單
59	Nexium 要飯前吃還是飯後吃，聽說飯前吃效果會比較好？	Nexium的成分為esomeprazole，其成分對酸不穩定。食物的攝取會延緩及降低33 - 53%吸收。盡量在飯前服用的效果會比飯後服用好。	仿單
60	病患詢問Nitrostat Sublingual Tablet開封後保存期限為多久？	使用後需栓緊瓶蓋，在室溫下(15~30度)保存。開封後半年，未使用的藥粒應丟棄。	台大藥劑部網頁

國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院
民眾用藥諮詢Q&A

藥物諮詢專線	藥物諮詢信箱
斗六院區：05-5323911 分機5186、5189 虎尾院區：05-6330002 分機8101、8151	斗六院區：drug_dl@ms1.ylh.gov.tw 虎尾院區：drug_hw@ms1.ylh.gov.tw

編號	諮詢問題	答覆	參考文獻
61	Normacol可以咬碎或泡水嗎?	<ol style="list-style-type: none"> 1.服用時請勿咬碎或咀嚼。 2.請勿泡水飲用，以免吸水膨脹。 3.不可乾燥吞服，飲用足量的水以避免腸道阻塞 4.心臟功能不佳者，請事先告知醫師。 5.不要與其他藥品一起服用，因可能會影響其他藥品作用，其他藥品服用時間請與本藥相隔2小時以上。 6.避免睡前服用。 	仿單
62	NovoMix 30 Penfill 未使用的保存期限為何?	<p>若未開封使用，且存冰箱2-8度，則可放至藥品外包上之保存期限。</p> <p>若已開封未冰存，建議保存期限為一個月。</p>	仿單
63	請問使用NTG後,可在使用Viagra嗎?	Viagra和NTG併用或間斷性使用都會增加低血壓的風險，此兩種使用方式為禁忌使用。	Micromedex
64	請問醫師開立Oestrogel 應該如何使用呢?	<p>使用方法</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 雙手先洗乾淨 2. 壓擠愛斯妥凝膠於計量尺之凹槽內 3. 建議使用一計量尺(約2.5克)，均勻塗抹於前臂、手臂、兩肩、腹部，請勿塗抹於乳房、陰部或陰道黏膜 4. 於早或晚沐浴後，每天同一時間使用 5. 通常連續使用三星期，停藥一星期 6. 需等待藥品吸收及揮發完全後再穿衣 7. 使用後若仍很黏著，表示塗抹面積太小，下次須塗抹較大面積 	仿單
65	病患詢問Pecolin Suspension可以和其他藥水一起服用嗎?	使用本藥物時，與其他藥物至少間隔 2小時以上服用。	台大藥劑部網頁
66	保栓通膜衣錠 Plavix (Clopidogrel) 75 mg/tab 可以跟魚油omega-3一起吃嗎?	保栓通 Plavix (Clopidogrel) 75 mg/tab為抗血小板藥物，預防血栓產生。魚油等富含omega-3脂肪酸會增加抗血小板藥物的影響，在高劑量使用下可能會增加出血的風險，建議有併用抗凝血劑或促血行循環的藥品須在醫生的指導和監督下再使用omega-3脂肪酸。	Micromedex
67	Premarin vaginal cream要如何使用?	<ol style="list-style-type: none"> 1.打開軟膏管蓋子。 2.將管狀送藥器栓緊在軟膏管嘴上。 3.擠壓軟膏管，使軟膏依所需劑量擠入送藥器內（如：0.5gm、1.0gm、1.5gm、2.0gm） 4.再分離送藥器與軟膏管。 5.先躺下後抬起膝蓋，再將裝有藥膏的送藥器輕輕插入陰道深部，然後推動推管將藥膏完全推入陰道內。 6.將使用後的塗藥器之推管及容器管分開，以少許肥皂和溫水沖洗、陰乾。 	仿單
68	Proctosedyl保痔寧軟膏使用方式	保痔寧軟膏用於肛門，在排便後、沐浴後或睡前使用。可以少量塗於肛門痛癢處。也可將所附軟管插在藥膏管口，再插入肛內，輕輕指壓及轉動藥膏後拿出，即可均勻塗抹於傷口。	第7頁 仿單 20頁

國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院
民眾用藥諮詢Q&A

藥物諮詢專線	藥物諮詢信箱
斗六院區：05-5323911 分機5186、5189 虎尾院區：05-6330002 分機8101、8151	斗六院區：drug_dl@ms1.ylh.gov.tw 虎尾院區：drug_hw@ms1.ylh.gov.tw

編號	諮詢問題	答覆	參考文獻
69	因月經未來，醫師有開予 Progesterone 成份的藥品，服完兩三天後也還沒來，一般吃法為何？大概什麼時候會來？	催經是利用黃體素濃度的突然下降造成子宮內膜的崩解出血。口服藥使用五天後停藥，月經應在2-5天內來臨；一般吃法5-10天不等，因目前您才服用兩天，並無完成療程，故建議於藥品全數服畢後，月經應於停藥後2-5天來。請勿自行中斷，以免異常出血。	台大藥劑部網頁
70	請問prometin、cimetidine有無 Hyperprolactinemia 的副作用？	Prometin、Cimetidine有Hyperprolactinemia的個案報告。	Micromedex
71	醫生開protase可以管灌嗎？	打開膠囊，依無法吞服藥粒處理方式將藥品與酸性流質食物(如:蘋果泥)混合再管餵。若會阻塞NG tube者，則不建議使用。	台大藥劑部網頁
72	Relenza Rotadisks 瑞樂沙旋達碟 該如何使用？	<ol style="list-style-type: none"> 1. 移除藍色外蓋。 2. 抓住滑盤向外拉出，直到停下為止。 3. 輕壓白色滑盤兩側的指握部分。將滑盤從裝置主體取出。 4. 將一組新的RELENZA ROTADISK放上轉盤。 5. 將白色滑盤推回裝置主體內部。 6. 將DISKHALER固定於水平狀態。 7. 請您暫時還不要將DISKHALER放入口中。將DISKHALER從您的嘴邊移開，在舒適範圍內盡可能地吐氣。不要對著DISKHALER吹氣，這樣會將藥物粉末吹出ROTADISK。 8. 盡量向外拉出白色滑盤(請勿將其完全取出)，然後將它推回原位。 9. 在您吸入完整劑量的藥物後(通常為兩個泡殼)：請以紙巾擦拭吸嘴，並將藍色外蓋裝回原位。務必保持DISKHALER的清潔。 10. 當四個泡殼全都用完時，從DISKHALER取下ROTADISK，然後按照步驟1至5裝上一組新的藥物。 	仿單
73	請問我的父親早天開始服用結核病的藥，今天早上印傭告知發生血尿，是否因藥物引起，要有任何處理？	病人用藥有抗結核病用藥Rifampin (立復黴素膠囊)，此藥服用期間，尿液、糞便、唾液、痰液、汗水及淚水都會變紅，但不會造成危害。服用本藥期間應定期訪視醫師並作檢查。	仿單
74	我的小孩服用Ritalin、Concerta 很長時間，老師這幾天告訴我小孩的嘴角會抽搐，怎麼辦？	Ritalin、Concerta會發生肌肉抽搐的不良反應，可先回來看醫師，請醫師評估是藥物或疾病的因素。	Micromedex
75	病患詢問哺乳中可使用 Roaccutane Capsule嗎？	由於Roaccutane Capsule的成分isotretinoin具高親脂性，此藥很可能分泌於乳汁中，因為這個不良作用的可能性，授乳母親應避免使用。	Micromedex
76	病患表示服用A酸約20天，為何痊癒沒有改善，仍一直長？	本院A酸製劑為Roaccutane® (Isotretinoin 10 mg/cap)，主要治療傳統療法無效之嚴重痤瘡；仿單內有記錄：Roaccutane®的療效反應和不良反應事件與劑量有關且因病人而異；每個病人的療程時間因每日劑量不同而變動，通常痊癒達到完全緩解需要16-24個星期。	仿單

國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院

民眾用藥諮詢Q&A

藥物諮詢專線	藥物諮詢信箱
斗六院區：05-5323911 分機5186、5189 虎尾院區：05-6330002 分機8101、8151	斗六院區： drug_dl@ms1.ylh.gov.tw 虎尾院區： drug_hw@ms1.ylh.gov.tw

編號	諮詢問題	答覆	參考文獻
77	病患詢問Sconin Oral Suspension藥袋上標註需要時每六小時一次，病患詢問何時為需要時？	發燒38.5°C以上，即肛溫（耳溫）超過38.5°C，腋溫37.5°C，口溫38°C以上時，每六小時服用一次。	台大藥劑部網頁
78	請問服用Seroquel XR 200mg是否會造成肥胖？	有7%可能造成體重增加現象	Micromedex
79	請問醫生開立Sevina該如何服用？一天一次要何時服用？	固定每日同一餐服用一錠，持續使用不間斷，需按照順序使用。先由藍色服用→白色→橘色；若有噁心現象，則隨餐服用。	仿單
80	Sokerz 舒克痔栓劑使用方式	肛門用。排便後，沐浴後或睡前使用。栓劑：剝去包裝後，以涼水潤滑，側躺於床，另一側腿屈膝向前，膝蓋靠近胃部，用手指將栓劑慢慢推入直腸內，將臀部肌肉夾緊至少一分鐘，並維持此姿勢15分鐘，再洗淨雙手。	台大藥劑部網頁
81	Solaxin 200 mg/tab舒肉筋新錠尿液會變色嗎？	服用舒肉筋新錠時，可能會導致尿液顏色呈現橘或紅色，此為正常現象，請勿過度擔心。	台大藥劑部網頁
82	請問Stesolid Rectal Tube® 疏瘧直腸用液劑1/2量，怎麼用？第二劑量隔多久？	Stesolid Rectal Tube®-含量：10 mg/2.5 ml — 直接用針筒抽出多餘劑量，僅需要1/2量，每管含2.5ml，則抽出1.25c.c，剩餘即為1/2量。 第二劑量需間隔4-12小時才給第二個劑量。	仿單
83	Stilnox與Eurodin可以自行剝半使用嗎，會不會破壞劑型？	Stilnox雖為膜衣錠，但非控釋劑型，也並未註記不可剝半或磨粉。故只要均分得宜，對藥效無太大影響。 Eurodin為裸錠，可剝半或磨粉，無太大影響。若要調整劑量，請遵照醫囑切勿自行斷然停藥或減量。	台大藥劑部網頁
84	醫師第一次開立Symbicort，但感覺沒有吸到藥品？沒藥品還需要漱口嗎？	依仿單指示，當使用Symbicort時，由於投予的藥量很小，因此病患可能無法嚐到或感覺到藥物，但只要動作正確，其實是有藥物的。 因此吸入處方劑量後，需用水漱口以降低發生鵝口瘡的危險性。	仿單
85	我昨晚第一次服用Takepron OD，覺得咽喉痛痛的，可以停用改吃之前醫師開的Gaster-D？Takepron OD可以直接吞服嗎？	經查詢Takepron OD並無此副作用，但每人對藥品的反應不同，若不適加劇請告知醫師。 Takepron OD使用可以放在舌上等它溶解吞服，也可以直接配溫開水吞服，不可以咬碎。	台大藥劑部網頁
86	看到報紙上有說Theophylline可治療心跳太慢的消息，請問是真的嗎？	Theophylline依文獻記載對於部份有症狀心搏過緩的治療有其效益，建議用在病人有症狀性心搏過緩但不希望開刀時，但實質上仍欠缺更有力的研究與證據。 因相關文獻年代較久，目前手術方式與技術日新月異，建議與醫師充分討論病情控制方式。	Micromedex
87	請問服用Trandate會鼻塞嗎？	經文獻佐證鼻塞的發生率3%，請回診與醫師討論用藥。	Micromedex
88	醫生開 Utrogestan 但吞服困難怎麼辦？可以磨粉嗎？	該藥品是內含液體的軟膠囊劑不可磨粉 若無法吞服建議刺破膠囊，以針筒抽取內容物	第9頁，共20頁 台大藥劑部網站

國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院

民眾用藥諮詢Q&A

藥物諮詢專線	藥物諮詢信箱
斗六院區：05-5323911 分機5186、5189 虎尾院區：05-6330002 分機8101、8151	斗六院區： drug_dl@ms1.ylh.gov.tw 虎尾院區： drug_hw@ms1.ylh.gov.tw

編號	諮詢問題	答覆	參考文獻
89	請問viagra在開始性行為前多久服用？藥效可維持多久？	依據仿單建議：約在性行為前1小時視需要服用；代謝半衰期大約為4小時。	仿單
90	買了一瓶維骨力(Vialtril-S)，我要怎麼吃？	維骨力是商品名，成分是glucosamine(也就是所謂的固樂沙敏)，中文是葡萄糖胺，也就是義大利羅氏藥廠所生產的Vialtril-S，適用於退化性膝關節炎，可增加骨關節間潤滑度，改善關節活動功能及疼痛緩解。國外研究顯示長期使用對人體是安全的少數有腸胃不適、水腫或頭痛、失眠等副作用，但症狀不嚴重。Type II 糖尿病病人長期使用不會造成血糖升高。建議劑量glucosamine 1000-1500 mg/天，先吃6-8週，飯前15分鐘使用吸收較好。	仿單
91	維骨力可以治療骨質疏鬆嗎？	維骨力的主要成分是葡萄糖胺，此成份在人體內可自行合成，在軟骨與結締組織中，使軟骨吸收足夠潤滑液。當人體老化葡萄糖胺的合成和分解會失衡，引起關節僵硬、發炎、疼痛。服用維骨力在初期退化性關節炎可減緩關節不識，但跟治療骨質疏鬆沒有關係。	《正確用藥—銀髮族最常問藥師的100個問題》
92	院內維骨力一顆內含葡萄糖胺多少毫克？一般常用劑量為何？	Crystalline Glucosamine sulphate結晶型硫酸鹽葡萄糖胺總量為314 mg，葡萄糖胺為250 mg及64 mg氯化鈉，一般常用劑量為2# BID飯前15分鐘使用。	仿單
93	維蒂斯眼用凝膠成份是類固醇嗎，如何塗抹？	Vidisc Gel成份為Carbomer，是一種黏性聚合物的人工淚液，並非類固醇。點眼時管子拿直，如此可形成小滴，順利的從管嘴落下；塗抹後可能導致暫時性視力模糊，請小心。	仿單
94	請問Vit B.C若將膠囊打開服用會影響藥效嗎？	膠囊可以打開服用並不會影響藥效，若要整粒吞服也請多喝水服用	台大藥劑部網站
95	Wellbutrin XL 150 mg/tab威克倦持續性藥效錠一天一次何時服用？	由於失眠是非常常見的副作用，常為暫時性的，可避免於就寢時間服藥，建議早上服用，下次給藥需間隔24小時。	仿單
96	Xeloda這化療藥要吃多久？怎麼吃？	1. 醫師會決定您需要治療多久。請遵照醫師指示服用，勿自行增減藥量或任意停藥。 2. 本藥於早、晚飯後30分鐘內與水吞服。一般建議連續服用14天後停藥7天，以21天為一週期。	台大藥劑部網頁

國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院
民眾用藥諮詢Q&A

藥物諮詢專線	藥物諮詢信箱
斗六院區：05-5323911 分機5186、5189 虎尾院區：05-6330002 分機8101、8151	斗六院區：drug_dl@ms1.ylh.gov.tw 虎尾院區：drug_hw@ms1.ylh.gov.tw

編號	諮詢問題	答覆	參考文獻
97	請問我本身是過敏體質，這些藥有這麼多副作用，真的可以服用嗎？而且我是鼻子過敏，沒有發炎，為什麼要吃Xyzal？發炎不是要吃抗生素嗎？我的胃不好，吃這些藥不用搭配胃藥嗎？	藥袋上標示的副作用是提供您做參考，萬一發生這些情況時，要盡快回診告訴醫師，不一定服用這些藥品就會產生這些副作用，所以請依照醫師的指示服用，不可擅自停藥。 這次就診醫師診斷您的症狀為蕁麻疹，蕁麻疹是體內肥大細胞釋出組織胺造成皮膚局部的突起與搔癢，這也算是一種發炎反應，所以抗組織胺藥物是首選用藥，也就是醫師開給您的Allegra和Xyzal，剛好這類的藥物治療您鼻子過敏也很有效。 抗生素要用在有細菌感染的時候，不一定所有的發炎都是細菌引起，所以發炎不是吃抗生素治療。 Allegra和Xyzal不會傷胃，不需要搭配胃藥使用。其實大部分的藥品都不需要搭配胃藥使用，有些藥品和胃藥一起服用反而會降低療效。	台大藥劑部網頁
98	Zithromax susp.泡製？	1.輕拍瓶將瓶內粉末弄鬆。 2.利用內附針筒加入 9 c.c.冷開水並立即搖動以溶解粉末，請搖至粉末完全溶解(總量約為 15 c.c.)。 3.懸液存於室溫下，可保持十天。 4.稀釋後濃度為 Azithromycin 40mg/mL(c.c.)	台大藥劑部網頁
99	止瀉劑為什麼要間隔2小時候服用	止瀉劑中的高克痢及舒腹達，兩項的吸附作用可能會干擾其他藥品的吸收及排除，所以建議間隔一段時間再服用	台大藥劑部網頁
100	什麼是火燒心？	火燒心又叫做胃食道逆流，常見的症狀有胸口不舒服、灼熱悶痛、口中有酸味、喉嚨刺痛。火燒心又叫做胃食道逆流。	用藥安全手冊 600問
101	火燒心引發的原因？	長時間三餐飲食不定時、生活作息不正常、飲食習慣不佳、抽菸、餐後立刻躺下、服用藥物都可能引發火燒心。	用藥安全手冊 600問
102	火燒心可以常常服用胃乳改善症狀嗎？	市售胃乳屬於制酸劑，藉由氫氧化鋁或氫氧化鎂等弱鹼性藥物來中和胃酸，減少胃酸對食道黏膜的傷害。長期服用會使消化功能變差，或引起便秘或腹瀉。若有火燒心症狀應就醫，不宜長期自行服藥。	用藥安全手冊 600問
103	病人家屬請藥師幫忙辨識家中小孩所服用藥物是否合法？有無成癮性？安全性？	1.病人取出藥物為lorazepam 2 mg/tab，經詢問服用者為28歲男性，因晚上無法入眠而自行至藥局購買藥品。家人擔心結交壞朋友而服用違法藥物，因此前來諮詢。 2.此藥可用於幫助睡眠，而其上有衛生署核准字號，就外表觀察應屬合法藥品，若在醫師指示下使用屬相當安全的藥品，不須擔憂成癮性問題，不建議自行購買使用。 3.建議若是有睡眠問題可先從生活習慣著手，如運動、避免熬夜等，或是至醫院就診睡眠相關諮詢如睡眠中心。	台大藥劑部網頁

國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院

民眾用藥諮詢Q&A

藥物諮詢專線	藥物諮詢信箱
斗六院區：05-5323911 分機5186、5189 虎尾院區：05-6330002 分機8101、8151	斗六院區： drug_dl@ms1.ylh.gov.tw 虎尾院區： drug_hw@ms1.ylh.gov.tw

編號	諮詢問題	答覆	參考文獻
104	請問Mycomb耳滴劑該如何使用？	先將手洗乾淨，用手握住瓶身數分鐘，使其溫度接近體溫，側躺耳多朝上，將耳往後上方拉，再滴入藥劑三滴，保持相同姿勢5~15分鐘	台大藥劑部網頁
105	醫師開可悅您控制血壓,最近血壓正常我可以不要吃嗎，可以跟詩維娜錠一起吃嗎？	長期服用心血管藥品患者,不建議擅自停藥，即使血壓正常也要定期服用藥品，以控制血壓的穩定。兩者藥品經micromedex 文獻查詢交叉比對無明顯交互作用可以一起併服。	Micromedex
106	請問Aprovel的作用機轉是？可治療蛋白尿？	Aprovel屬Angiotensin II receptor antagonists，可治療蛋白尿。	台大藥劑部網頁
107	我今天的血壓是100/62, 血壓藥還吃嗎？ 會不會血壓太低？降血脂的藥飯前兩天吃一次，是什麼時候吃？	查詢用藥紀錄，醫師開立Blopess 1# qd *28 天治療高血壓,衛教患者血壓藥必須遵定時服用，不是血壓不高就不吃，建議患者應記錄每次測量的血壓值，就診時提供醫師用藥調整。 Lipitor,每兩日服用一次，固定時間，服藥早晚不拘，隨餐或空腹均可。	用藥安全手冊 600問
108	克流感泡完水後要怎麼儲存	未超過25度C可放置10天，冷藏 2~8度C可放置17天	仿單
109	克流感什麼時候吃一定要吃完嗎？ 可以跟速熱寧藥水一起吃嗎？	1.克流感每天二次，持續五天的療程。空腹或在餐後服用本藥均可，如感覺腸胃不適（如噁心、嘔吐等），可與食物併服。您需將整個療程的藥品服用完，不可在感覺症狀改善時，即自行停藥，否則體內的病毒可能未清除完全。 2.Sconin(Ibuprofen)藥水無明顯交互作用可以一起併服	Micromedex
110	利尿劑晚上服用會影響睡眠嗎？	利尿劑會增加尿量及排尿次數，所以晚上服用會影響睡眠。如一天服用一次，建議早餐後服用；如一天服用多次，建議最後一劑在下午6點以前服用。	台大藥劑部網頁
111	使用吸入劑使後，為什麼要漱口？	含有吸入型類固醇的吸入劑，每次使用藥品後，請用清水漱口，然後吐掉(不可吞下)減少口咽部長鵝口瘡(念珠菌感染)的機會。	仿單
112	吸入劑噴口可以用水洗嗎？	乾粉吸入劑噴口不可清洗，避免水進入容器引起藥品潮解。使用後用衛生紙擦拭即可。	仿單

國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院
民眾用藥諮詢Q&A

藥物諮詢專線	藥物諮詢信箱
斗六院區：05-5323911 分機5186、5189 虎尾院區：05-6330002 分機8101、8151	斗六院區：drug_dl@ms1.ylh.gov.tw 虎尾院區：drug_hw@ms1.ylh.gov.tw

編號	諮詢問題	答覆	參考文獻
113	Berotec吸入劑如何使用？	<p>新藥瓶使用前須先充分搖動藥液、按壓1-2次，確定排除管腔空氣。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、拿開吸入器保護蓋 2、上下搖動噴霧器，預防藥物顆粒沉澱 3、將吸入輔助器（白色塑膠管）較粗的一邊和吸入器含口器（剛剛拿開蓋子的地方）連接 4、將蓋子和吸入輔助器（白色塑膠管）較細的一邊連接（把管子蓋住） 5、確認部位都組合好沒有鬆脫 6、用手指和拇指直立的拿吸入器，將拇指放在底部(瓶底朝上、吸口朝下) 7、用食指按壓噴霧罐的底部，按壓次數依照醫師指示 8、慢慢呼氣，然後將在吸入輔助器上之護蓋移除，趕快將吸入輔助器的開口含在口中 9、持續緩慢深吸氣，吸氣動作不要間斷 10、閉氣至少5-10秒鐘，然後恢復正常呼吸 11、護蓋及吸入輔助器須經常清洗並立即烘乾 	仿單
114	請問Nasonex吸入劑的使用方法？	<ol style="list-style-type: none"> 1.使用前請先清潔鼻腔。 2.搖勻藥品，解開瓶蓋。 3.初次使用時，請將藥瓶上舉，食指與中指放在瓶肩處，大拇指放在瓶底。並對空壓放數次，直到藥劑噴出為止。 4.頭稍向前傾，噴霧器保持垂直，用手按住一鼻孔，將藥瓶噴口放進另一鼻孔，先將食指與中指放在瓶肩處，快速向下壓，直到盡頭用鼻吸入噴出之氣霧，再用口呼氣。換另一鼻孔使用，此為一劑量。(劑量請依醫師指示) 5.使用後清潔藥瓶與鼻子接觸部位，蓋回蓋子。 6.噴完15分鐘內，避免擤鼻子。 	仿單
115	請問該如何辨識Spiriva藥物使用完？	<p>藥物瓶身有紅色箭頭，在最初使用時箭頭會指在數字60處，使用時箭頭會往上升，若藥物剩下7天劑量會指在數字14處（紅色區塊），待藥物使用完畢則會指在數字0處。</p>	仿單
116	Seretide 50 Evohaler兒童吸藥輔助器如何使用？	<ol style="list-style-type: none"> 1.查看吸藥輔助器內部，確保其內無任何異物。 2.將定量噴霧劑的蓋子拔開。 3.請將噴霧劑上下充分搖勻至少五秒。 3.將藥瓶插入輔助器 4.將面罩罩住口鼻，輕壓勿使漏氣。 5.將定量吸入器一次按壓到底 6.請在輔助氣中緩慢呼吸6~10下或正常呼吸15~20秒。 7.如有第二劑量時請休息30秒後，重複第3-6步驟。 	仿單

國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院
民眾用藥諮詢Q&A

藥物諮詢專線	藥物諮詢信箱
斗六院區：05-5323911 分機5186、5189 虎尾院區：05-6330002 分機8101、8151	斗六院區：drug_dl@ms1.ylh.gov.tw 虎尾院區：drug_hw@ms1.ylh.gov.tw

編號	諮詢問題	答覆	參考文獻
117	請問醫師開立2種戒必適該如何服用？	第一週的戒必適包裝共有11顆藥錠在一片鋁箔上，每錠戒必適皆為0.5毫克；服用的方式為第一到三天每天一錠，建議在吃完晚餐後配合一大杯的開水直接吞服，接下來第四到第七天為一天兩次，一次一錠，建議服用時間為用完早餐與晚餐後配合一大杯開水吞服。 第二週以後的戒必適包裝為14顆1毫克錠劑在一片鋁箔上，服用方式為一天兩次，一次一錠，建議在用完早餐與晚餐後配合開水吞服。	仿單
118	尼古清薄荷咀嚼錠要怎麼使用？	醫生所開立的尼古清薄荷咀嚼錠為戒菸輔助劑。是藉由咀嚼而釋放出的尼古丁而降低對尼古丁的渴求和緩解斷癮症狀。當您想要抽菸的時候，即可取出一咀嚼錠使用。慢慢咀嚼治味道變強時，先暫停咀嚼，然後含在牙床和臉頰之間。當味道漸漸變淡時，再嚼幾次使其味道變強，再含在口內。可僅記口訣：嚼十下，含三分鐘，再嚼十下...。如此重複步驟約半小時。此咀嚼錠是經由口腔黏膜吸收，由唾液吞入尼古丁並無好處，因此建議不要用吞入口水的方式以免造成喉嚨或胃的不適。每次使用咀嚼錠使用一片即可，一般人一天可能用至8-12片，建議每天不可超過24片。	仿單
119	抗生素糖漿是否需儲存於冰箱	不一定，藥品未沖泡前可於室溫儲存，沖泡後依該藥品保存方法作保存，需冷藏的儲存於冰箱冷藏室，不可冷凍保存，不需冷藏的放置於陰涼處即可。沖泡後的懸浮液有其保存期限，請依照藥袋標示保存。一般抗生素為懸浮液，使用前須將其搖勻。	台大藥劑部網頁
120	請問我有二尖瓣膜脫垂，要拔牙，抗生素一次吃這麼多對嗎？	因您有心臟問題，在拔牙前，醫師會請您吃高劑量的抗生素，避免因拔牙的傷口，使得口腔內的細菌跑進血液，進入心臟瓣膜，導致心臟瓣膜壞死，先預服抗生素，可降低此併發症風險。	台大藥劑部網頁 /Micromedex
121	醫師開的抗生素是否應全部吃完？	抗生素使用有一定的適應症與療程，療程、給藥途徑會因藥品、病原菌、感染部位及嚴重程度而不相同，千萬不可以認為症狀已經消失或緩解就自行停藥、減量或不規則服藥，必須依照醫師囑咐持續用藥，直到整個療程結束才可停藥。如此才能消滅病菌，避免細菌之抗藥性不斷增強而造成治療失敗。	衛生福利部疾病 管制署抗生素衛 教問答集

國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院

民眾用藥諮詢Q&A

藥物諮詢專線	藥物諮詢信箱
斗六院區：05-5323911 分機5186、5189 虎尾院區：05-6330002 分機8101、8151	斗六院區： drug_dl@ms1.ylh.gov.tw 虎尾院區： drug_hw@ms1.ylh.gov.tw

編號	諮詢問題	答覆	參考文獻
122	每六小時服用一次藥品，睡覺期間是否需要刻意起床服藥	固定時間服用的主要目的是要是維持穩定藥物血中濃度，最好狀況準時服用藥品照時間服用。一般建議上午5、11點及下午5、11時服藥。若無法起床服藥，可以將睡眠時間當成一間隔，其餘時間平均分配，達到每日服用4次完整治療劑量。	衛生福利部疾病管制署抗生素衛教問答集
123	為什麼有些藥物需空腹服用	空腹服藥是指於餐前一小時或飯後兩小時服用，些許藥物與食物併服會防礙藥品的吸收，降低藥品在身體內的濃度而減低藥效。例如：用於治療胃食道逆流、胃潰瘍的耐適恩錠(Nexium)，食物會降低藥物的吸收	藥品仿單
124	藥品可以和牛奶一起服用嗎	不建議，原則上服藥時，最好以白開水服藥。有些藥(例如：四環素、速博新)會與牛奶中的鈣結合形成不溶性物質，而影響到藥品療效，建議藥品與牛奶最好間隔兩小時以上服用。	台大藥劑部網頁
125	咖啡因對藥品有何影響	咖啡因有中樞神經興奮的作用，如果同時使用鎮靜安眠藥品時，會降低鎮靜安眠藥品效果，也容易使其他藥物的代謝下降，可能增加副作用，'所以建議吃藥時避免搭配茶葉或咖啡。	台大藥劑部網頁
126	忘記吃藥，下回吃藥時可以連帶補吃上一次的藥量嗎？	不可以，除非有醫師特別指示。下回吃藥時只要服用正常藥量即可，不要服用雙倍藥量。	台大藥劑部網頁
127	小孩誤食藥品，如何解決？	最好的方法是盡快就醫，並將剩餘的藥品、外包裝、藥袋、容器或嘔吐物保留，交由醫護人員進一步做分析判斷。	用藥安全手冊600問
128	吃藥時可以搭配果汁或是茶一起喝嗎？	服藥時應以「白開水」配服，將藥物搭配果汁、茶或梅子餅可能會改變某些藥物的酸鹼反應或相剋而影響療效甚至中毒，當然，並不是每種藥都會產生這種現象，所以若有特殊需要可先請教藥師。	台大藥劑部網頁
129	醫生開愛妥糖，藥袋沒註明飯前或飯後服用，請問什麼時候吃比較好？	請遵照醫師處方使用。飯前飯後均可，有任何問題請教藥師或醫師。	仿單/廠商
130	請問nexium、dogmatyl什麼時候服用最佳？	Nexium: 1. 遵照醫師處方服藥。通常一天服用一次，餐前服用。 2. 請整粒吞服，不可嚼碎。 Dogmatyl: 1. 遵照醫師處方服藥 2. 仿單無特別註記，飯前一小時或飯後一小時服用即可。	台大藥劑部網頁

國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院

民眾用藥諮詢Q&A

藥物諮詢專線	藥物諮詢信箱
斗六院區：05-5323911 分機5186、5189 虎尾院區：05-6330002 分機8101、8151	斗六院區：drug_dl@ms1.ylh.gov.tw 虎尾院區：drug_hw@ms1.ylh.gov.tw

編號	諮詢問題	答覆	參考文獻
131	服用阿斯匹靈期間可以拔牙嗎？	因為阿斯匹靈會抑制血小板凝集而導致出血的副作用，服用阿斯匹靈者藥進行手術或拔牙前，必須先停藥七至十天，以避免手術時大量出血。	用藥安全手冊 600問
132	服用冠脂妥可以吃紅麴嗎	紅麴成分中含Monacolin K，結構與降血脂類藥物中Lovastatin相同，具有抑制肝臟合成膽固醇的效果，所以當冠脂妥和當紅麴併用會增加副作用發生的風險	用藥安全手冊 600問
133	我小孩感冒沒有發燒可以預防接種嗎？	一般除發高燒及染患急性疾病，考量接種疫苗後的反應可能會影響病情的判斷不要接種外，如感冒已進入恢復期僅流鼻水等症狀，是可以接種的，如父母仍不放心，應請醫師評估。	疾病管制局~兒童預防接種相關事項
134	家屬表示：小朋友施打日本腦炎第一劑，第二劑應於兩個禮拜後施打，但因為當天有事，是否可提早兩天施打？	經查詢疾病管制局/預防接種-疫苗的提前接種與間隔的縮短 建議；接種間隔日本腦炎前兩劑間隔兩週不宜再縮短，第三劑與第二劑至少間隔六個月。並詢問兒科診間，診間小姐表示：日本腦炎疫苗第一、二劑間隔兩週，不建議縮短但可延長。	疾病管制局~兒童預防接種相關事項
135	有無水痘疫苗?一般成人水痘疫苗要施打幾劑？	大於12歲以上之成人須施打兩劑水痘疫苗，兩劑至少隔開4~8週。	台大藥劑部網頁
136	感冒時可停用降血壓藥嗎？	不可以。高血壓為一慢性疾病，需長期服藥控制，因此不建議在罹患感冒時擅自停藥，以免影響血壓的控制。	用藥安全手冊 600問
137	請問我目前有在哺乳吃了偏頭痛的藥ergoton還可以哺乳嗎？	Ergoton會分泌於乳汁中。發現受哺乳的嬰兒出現嘔吐、下痢、痙攣。 美國小兒科醫學會將Ergotamine歸類為須小心使用，故媽媽服用此藥時不建議哺乳。	Micromedex
138	請問服用Ergonovin可以哺乳嗎？	Ergonovin已被證實會分泌至乳汁，故不建議哺乳	Micromedex
139	服用Tamiflu 可以授乳嗎？	也唯有在確認Tamiflu®對授乳母親的益處大於可能對哺育中嬰兒的危險之後，才能讓授乳母親服用此藥物。	Micromedex
140	請問服用 Cephalexin可以哺乳嗎？	母乳營養可被視為安全的。	第10頁，共20頁 Micromedex

國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院
民眾用藥諮詢Q&A

藥物諮詢專線	藥物諮詢信箱
斗六院區：05-5323911 分機5186、5189 虎尾院區：05-6330002 分機8101、8151	斗六院區： drug_dl@ms1.ylh.gov.tw 虎尾院區： drug_hw@ms1.ylh.gov.tw

編號	諮詢問題	答覆	參考文獻
141	我有在服用Mgo、panadol、flagyl可以繼續哺乳嗎?	1.Mgo 在母乳有被發現，正常使用情況下影響不大。 2. panadol低濃度的排到母乳，新生兒的尿液中被檢測出來，使用上需注意。 3. metronidazol 會分泌到母乳內，在新生兒的血液中也檢測出來。服用藥品期間不建議哺乳	Micromedex
142	氣喘用藥有什麼需要特別注意的嗎?	若有特殊疾病，如青光眼、高血壓等應告知醫師，因為藥品可能引起交互作用。含類固醇吸入劑使用後應漱口，避免藥品降低口腔免疫力引起念珠菌感染，即所謂的鵝口瘡。	用藥安全手冊
143	請問氧化鎂的作用是什麼?	軟便劑；制酸劑	台大藥劑部網頁
144	目前小朋友有發燒現象，因3月就診時，有退燒藥(Sconin&Voren supp.)，請問是否可以給退燒藥?	當體溫 > 38.5°C時，使用退燒藥水，若發燒斷斷續續發生，請退燒藥水每隔6小時給一次。 -若體溫 > 39°C時，使用退燒栓劑。 -隨時量體溫，觀察體溫變化及小朋友活動量。 -當小朋友活動力不佳、出現抽搐、虛弱或異常哭鬧情形時，請儘速回到醫院。	台大藥劑部 網頁
145	請問院內31G的針頭是多少mm?	31G針頭為 8mm大小	台大藥劑部網頁
146	有時候生病吃別的藥，發現這段時間血壓控制比較不好，為什麼?	常見可能會引起高血壓的藥物包括感冒藥、止流鼻水藥物、消炎止痛藥物、安非他命、食慾抑制劑、口服避孕藥、類固醇、免疫抑制劑...等等，若您有服用這些藥品，請向醫師或藥師詢問對於血壓的影響。	用藥安全手冊
147	戴隱形眼鏡點可以直接點眼藥水嗎?	藥品有可能會沉澱在隱形眼鏡上，應先將隱形眼鏡取下再點眼藥水。	用藥安全手冊
148	眼藥水一定要冰在冰箱嗎?	除了部分藥品要冷藏（如本院Xalatan），一般眼藥水僅需放在室內陰涼處保存即可。開瓶後保存期限為一個月。	用藥安全手冊/ 台大藥劑部網頁

國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院
民眾用藥諮詢Q&A

藥物諮詢專線	藥物諮詢信箱
斗六院區：05-5323911 分機5186、5189 虎尾院區：05-6330002 分機8101、8151	斗六院區：drug_dl@ms1.ylh.gov.tw 虎尾院區：drug_hw@ms1.ylh.gov.tw

編號	諮詢問題	答覆	參考文獻
149	鹽酸四環素眼藥膏如何使用?	將手洗淨，打開蓋子再將頭稍往前傾，將下眼瞼輕輕往下拉，將藥膏管置於眼前與眼睛平行，沿著下眼瞼的上面擠出約1公分的藥膏，避免藥膏管尖端與眼睛、手指或臉接觸。將眼睛閉起一到二分鐘使藥品吸收。旋緊蓋子，拭去流出眼睛的藥膏，並再次洗手。	台大藥劑部網頁
150	鈣片要嚼碎嗎？應飯前或飯後服用？	鈣片嚼碎後作用較佳。服用方法為隨餐或餐後服用，以一杯水伴服。	用藥安全手冊 600問
151	新聞報導說吃愛妥糖會得癌症，我還可以吃嗎？	衛生署食品藥物管理局表示，國內愛妥糖不良反應通報中，沒有膀胱癌病例通報，愛妥糖的藥品仿單注意事項中已註明其具致癌性，食品藥物管理局將再評估愛妥糖的風險與效益。 糖尿病本身即容易引起多種疾病病變，且是各種癌症的好發族群，膀胱癌究竟是藥物還是血糖控制不佳造成，因果關係認定有困難性。正在服用愛妥糖藥物的患者不要擅自停用，建議回門診向醫師諮詢。	衛生署食品藥物管理局
152	萬克適錠藥品作用是什麼？	1.緩解發炎及因發炎所引起的疼痛。 2.非類固醇抗發炎藥，可用於骨關節炎與類風濕性關節炎症狀的慢性治療、治療急性痛風性關節炎及原發性經痛	台大藥劑部網站
153	嬰兒上吐下瀉可以用運動飲料補充電解質嗎？	運動飲料電解值含量及糖分過高，必須稀釋後再使用。可到藥局買電解質水補充電解質，開瓶後24小時應丟棄，避免細菌汙染，也不可過量飲用以免電解質不平衡。	用藥安全手冊/ 台大藥劑部網頁
154	平常需要特別補充維他命嗎？	平常若飲食均衡，每天所攝取的維生素足夠身體所需，不需要另外攝取。若服用抗凝血藥物，應減少攝取維他命K或維他命E。某些疾病由維他命缺乏引起，才需要特別補充。像腳氣補充維他命B1、口腔潰瘍補充維他命B2。	《正確用藥—銀髮族最常問藥師的100個問題》
155	醫生開蓋舒泰作用是什麼？有特別需要注意的事項？	1.抑制胃酸分泌，治療潰瘍或逆流性食道炎。 2.蓋舒泰D 口溶錠請置於舌上，待崩散後以唾液或水吞服，不可在躺下的狀態下，不用水吞服 3.請遵照醫囑，持續服藥至療程結束，勿自行停藥，並按時回診，以助醫師決定停藥時機。	台大藥劑部網站 第 18 頁，共 20 頁

國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院
民眾用藥諮詢Q&A

藥物諮詢專線	藥物諮詢信箱
斗六院區：05-5323911 分機5186、5189 虎尾院區：05-6330002 分機8101、8151	斗六院區：drug_dl@ms1.ylh.gov.tw 虎尾院區：drug_hw@ms1.ylh.gov.tw

編號	諮詢問題	答覆	參考文獻
156	醫生開瀉藥樂可舒可以跟其他藥一起吃嗎；一定要每天服用嗎？	錠劑的外面特別包了一層膜，使其不會造成刺激和噁心的副作用。為了使這一層外膜發揮效用，請整顆吞服，不要咬碎、壓扁，在服用此藥後一小時內請勿服用制酸劑或牛奶。口服其他藥物之後2小時內禁服此藥。 除非有醫師的處方或是特別交代，此藥不宜連續使用一週以上，若排便情況有改善並不一定每天服用。長期使用此藥會使您對瀉劑產生依賴，並使腸道失去它正常的蠕動能力。	台大藥劑部網頁
157	請問我現在懷孕，忘記告知醫師，不知醫師開給我的藥品，懷孕服用是否安全(Panadol、Lopedin、Prometin)?	Panadol成分為Acetaminophen；Lopedin成分為Loperamide；Prometin成分為Metoclopramide，此3種藥品懷孕分級皆為B級，所以服用的安全性比較高。建議懷孕時用藥須和婦產科醫師討論。	Micromedex
158	病人懷孕目前正在使用novomix，但查詢novomix懷孕分級為C，是否可繼續使用？	糖尿病患者懷孕期間，應選擇皮下注射胰島素治療。	Micromedex
159	請問孕婦可以服用Naposin、Solaxin？	安全性未知，請和婦產科醫師討論。	Micromedex
160	請問懷孕初期可以服用Foxate嗎？	動物試驗顯示，本品對孕婦及胎兒無害，然而在懷孕期間，假如要和其他藥品一起服用必須要小心，尤其在懷孕的前三個月。	Micromedex
161	請問服用A酸多久內部可懷孕？	患者服藥期間及停藥後至少4個星期內，絕對不可懷孕。	仿單
162	患者已懷孕7週，在不清楚已懷孕下，施打Engerix-B，詢問該怎麼辦？	Engerix-B懷孕分級為C級。目前並無足夠的於人類懷孕期間使用之資料及動物生殖研究。然而，與其它去活性病毒疫苗一樣，我們並不希望胎兒受到任何傷害。因此，只在明確必要且潛在效益超越對胎兒的潛在危險性時，才可在懷孕期間使用Engerix-B。建議患者回診與醫師討論。	Micromedex
163	懷孕期間葉酸每天的服用劑量？	懷孕時每天的維持劑量 0.8mg。	仿單
164	請問懷孕可以服用Cephalexin和Panadol？	這兩種藥品在懷孕分類為B級，對人類無證據顯示具危險性。動物生殖研究無法證實對胎兒之危險性，但無懷孕婦女之對照試驗；或動物生殖研究顯示有不良反應（除生殖能力降低之外），但卻無法在第一期懷孕婦女之對照研究中證實，且對於後期亦無致危險之證據。	Micromedex

國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院
民眾用藥諮詢Q&A

藥物諮詢專線	藥物諮詢信箱
斗六院區：05-5323911 分機5186、5189 虎尾院區：05-6330002 分機8101、8151	斗六院區：drug_dl@ms1.ylh.gov.tw 虎尾院區：drug_hw@ms1.ylh.gov.tw

編號	諮詢問題	答覆	參考文獻
165	請問懷孕婦女可以打破傷風嗎？	TETANUS TOXOID US FDA懷孕分級為C，澳洲懷孕分級為A。施打toxoid對懷孕婦女是安全的，且建議使用於沒有免疫力的母親來預防新生兒破傷風。	Micromedex
166	沒有精神上的問題及噁心嘔吐的狀況，為什麼會開立穩舒眠	穩舒眠除了可以穩定情緒及止吐外，還可以用來緩解打嗝的症狀	Uptodate
167	服用鐵劑後有排黑便的情形	排黑便是鐵排除所造成的正常現象。	仿單
168	服用鐵劑時該注意甚麼事項	一般建議鐵劑於空腹時服用，主要是因為鐵劑在酸性環境下吸收較好。胃藥一方面會降低胃中酸度，一方面含有鈣等金屬鹽類，會降低鐵劑吸收，故不建議將鐵劑與胃藥或含上述金屬鹽類之藥物併用(如鈣片)，若因鐵劑造成腸胃不適，可於飯後服用鐵劑，但要注意食物應避免同時食用蛋、乳製品或高纖維食物，以免降低鐵劑吸收。	台大藥劑部網頁
169	Avamys nasal spray使用方式？	<p>做好預先灌注- 蓋子蓋上並充分搖動，以手指壓住蓋子並直接向外拉以打開蓋子。打開蓋子時請勿按壓按鈕。</p> <p>將噴嘴朝上並遠離自己，大拇指放於按鈕上。接著確實壓放按鈕6次，或是直到有均勻噴霧自噴嘴噴出。</p> <p>1.置入 將頭稍微前傾，藥瓶朝上，將噴嘴置入於其中一個鼻孔。將噴嘴末端朝向鼻子外側邊，遠離鼻中隔。如此有助於將藥品送至鼻內正確位置。</p> <p>2.按壓 在您吸氣時確實按壓按鈕1次以將藥品噴入鼻中。勿讓噴霧接觸眼睛。若接觸到，以清水沖洗眼睛。取出噴嘴，並由嘴巴呼氣。</p> <p>3.重複 重複步驟1、2將藥品送入另一個鼻孔。若您的醫師告訴您每個鼻孔使用兩次，請重複步驟1至3。使用後請將蓋子蓋上。</p>	仿單
170	我在外面有吃攝護腺的藥品,跟泌尿科hytrin可以一起吃嗎?	回覆患者在院外的攝護腺藥品(暢流錠；健喬信元醫藥；Terazosin 2mg)與該院泌尿科醫師開立的hytrin同成分劑量，建議患者先將院外的藥品服完後，再繼續服用hytrin，避免重複用藥而導致藥品過量的情形發生。	台大藥劑部網頁